RSP – VOILET LITTORAL

**VEILLE SUR LES CONTAMINANTS ORGANIQUES
HYDROPHOBES D'INTÉRÊT ÉMERGENT EN
MILIEU MARIN**

VEILLE-POP

Acquis et Perspectives

Resp: Catherine Munsch,
IFREMER/BE/LBCO

COLLOQUE RSP – 22/03/2021

Veille POP : un suivi des CEC prospectif et évolutif

Contaminants d'Intérêt Emergent (CEC)

Réseau européen
NORMAN*

*Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances

- ✓ Non inclus dans les programmes de surveillance
- ✓ Récemment utilisés ou considérés
- ✓ Devenir et effets peu/pas connus
- ✓ Peu/pas de données environnementales (côtes françaises)

Persistants, Bioaccumulables, Toxiques

Transportés sur de longues distances

**Contaminants organiques hydrophobes
organo-halogénés**

Listes substances **prioritaires candidates** (POP-Convention de Stockholm, OSPAR, CIEM...)

OBJECTIFS

Niveaux et profils de contamination environnementale

- ✓ Occurrence
- ✓ Niveaux de concentration
- ✓ Distribution géographique
- ✓ Empreintes

Tendances temporelles (analyse rétrospective, banques d'échantillons environnementaux)

- ✓ Réponse environnementale des bivalves aux fluctuations des apports
- ✓ Impact de la réglementation (réduction, interdiction) sur les niveaux environnementaux

Caractérisation à large spectre de l'exposition - NTS

- ✓ 1^{ères} analyses non ciblées sur 10 sites du littoral représentatifs d'impacts urbains, industriels, agricoles et sites de référence

Stratégie d'échantillonnage

OSPAR Joint Assessment and Monitoring Program (JAMP) - ROCCH

- Compartiment environnemental = mollusques filtreurs
Moules, huîtres: intégrateurs de la contamination

IFREMER/O. Barbaroux

- Sites +/- soumis à l'influence d'apports anthropiques
Grands estuaires, + "références" non contaminées

- Fréquence choisie: annuelle (novembre)
Echantillons prélevés hors période de reproduction

- Archivage IFREMER, Unité Biogéochimie et Ecotoxicologie
Banque d'échantillons archivés depuis 1981 (ROCCH / Mytilothèque)

Contaminants étudiés

Contaminants d'intérêt émergent (CEC)

- ✓ Evolution des CEC étudiés fonction des réglementations / changements d'occurrence / tendances
- ✓ Lien groupe MCWG – CIEM / OSPAR

Retardateurs de flamme bromés (RFB)

Composés fluoroalkylés (PFAS)

Acides perfluorocarboxylique- PFCA
Acides perfluorosulfoniques- PFSA

Muscs synthétiques

HHCB
AHTN
Musc xylène
Musc cétone

Esters d'organophosphate (OPE)

TEP, TPRP, TNBP, TBOEP, TCEP, TPHP,
TCIPP, TDCIPP, TPEP, TDBPP, MPDPP

- Un laboratoire dédié à l'**analyse de CO à des niveaux de traces**

- ✓ 300 m² de laboratoires propres
- ✓ Atmosphère contrôlée
- ✓ Pression positive
- ✓ Personnel qualifié
- ✓ Procédures QA/QC

- **Méthodes validées pour le milieu marin** (justesse, répétabilité, sensibilité)

LOQ 10-30 pg g⁻¹ p.s.

Incertitudes comprises entre 10% et 40%

OPE: LOQ 150-3000 pg g⁻¹ p.s.

Exactitude vérifiée (concentration 5000 pg.g⁻¹ p.s.),

incertitudes comprises entre 21 et 48 %

Retardateurs de Flamme Bromés (RFB)

-

Distribution géographique

Tendances

Retardateurs de flamme bromés

□ Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

209 congénères différents

Electronique, plastiques, ameublement, textiles

- ✓ Trois mélanges commerciaux: PentaBDE, OctaBDE, DecaBDE
- ✓ Augmentation production mondiale depuis les années 80
- ✓ PentaBDE et OctaBDE : Interdiction en Europe **depuis 2004**
- ✓ POP-Stockholm depuis 2009

□ Hexabromocyclododecanes (HBCDD)

- ✓ Un des ignifugeants les plus utilisés au monde
- ✓ Mousses isolation thermique (construction), Textiles (meubles, voiture, matelas, ...), Electronique

- ✓ POP-Stockholm depuis 2013
- ✓ Utilisation et production interdite **après août 2015** dans l'UE

RFB alternatifs aux PBDE

BTBPE (1,2-bis(2,4,6-tribromophenoxy)ethane)

Utilisé depuis 80s en remplacement de octa-BDE dans PS, thermoplastiques, textiles, etc...

Production mondiale = 16 710 tonnes in 2001
 Production faible-volume en Europe (< 1000 tonnes/an)

Haut MW (687.6)
 Fort log K_{ow} (7-9)
 Faible TMF (1.8)

DBDPE (decabromodiphenyl ethane)

Utilisé depuis 90s en remplacement du deca-BDE dans plastiques, textiles, polymères, etc...

2^{ème} RFB plus utilisé en Chine
 Produit et/ou importé en Europe (10000-100000 tonnes / an)

Haut MW (971.2)
 Fort log K_{ow} (7-11)
 Fort TMF (8)

BTBPE

médiane 13 pg/g p.s.

< BDE-47 (médiane 147 pg/g p.s.)

> BDE-183 (médiane 4 pg/g p.s.)

DBDPE

médiane 42 pg/g p.s.

< BDE-209 (médiane 80 pg/g p.s.)

pg/g p.s.

Médianes tous sites

Médianes tous sites

ng/g p.s.

Substances Perfluoroalkylées (PFAS)

-

Distribution géographique

Tendances

Substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)

Wang et al., 2017, EST: A never-ending story of PFASs ?

Produits depuis plus de 60 ans
Emissions directes ou indirectes

Tensio-actifs, Lubrifiants, Revêtements textile/papier, Revêtements métalliques, industrie photographique, semi-conducteurs etc., Traitement surfaces, Emballages, Emulsifiant,...

Perfluorooctane sulfonate (PFOS)

- ✓ POP de la convention de Stockholm en 2009 (PFOA en 2019, autres PFAS en cours d'évaluation)
- ✓ Substance prioritaire pour l'UE (DCE)
- ✓ C₁₁-C₁₄ PFCA : candidats à la liste des substances extrêmement préoccupantes (REACH)

PFOS
 Detection 95 %
 Median = 311 pg/g p.s.

PFCAs
 69-100%
 Median = 871 pg/g p.s.

PFCAs / PFOS
 8 fois + élevé en Méditerranée
 ($p < 0.05$)

PFOS prédominant
jusqu'en 2013

- PFOS
- PFCA

- ✓ PFCA >> PFOS
- ✓ PFCA ↗ après 1995 puis stables

□ Evaluation des niveaux de composés précurseurs d'acides perfluorocarboxyliques

- ✓ Mise en œuvre d'un protocole d'oxydation forcée des précurseurs en PFCA

Précurseurs de PFCA

- ✓ Exemple en estuaire de Seine (2018)

- Forte contribution des précurseurs de PFCA (mesurés après oxydation)
- 2 % de Σ PFCA mesurés après oxydation sont accessibles par un protocole de routine
- Mise en évidence de la présence de PFAS inconnus

Profil caractéristique de 6:2 fluorotélomères

➔ Poursuite suivi géographique et temporel et identification de précurseurs

Niveaux de contamination comparés

Tous sites – 2016 à 2018

Approche non ciblée

- ✓ Développer un « workflow » de **préparation** des échantillons et de **traitement** du signal
- ✓ Caractériser les **empreintes chimiques** de contamination des organismes marins, identifier et inventorier les contaminants **anthropogéniques** et **naturels**
- ✓ Identifier les **pressions** des sites étudiés en distinguant les signaux **uniques** et **redondants**, ainsi que leurs **intensités** relatives
- ✓ Identifier des **contaminants d'intérêt émergent**

Rendue possible par des instruments de pointe

GC-APCI-HRMS-ToF

- Résolution élevée (> 60 000)
- Précision en masse ~1 mDa
- Excellente sensibilité
- GC-HRMS: technique de choix pour les contaminants hydrophobes

LC-ESI-HRMS-Orbitrap

Approche non ciblée

□ Analyse non ciblée pour caractériser les profils d'exposition

- ✓ 10 sites choisis du littoral français (différentes pressions)
- ✓ Purification et fractionnement des échantillons selon leur polarité
- ✓ QA/QC: étalons internes et externes marqués

Acquisition des signaux

Identification de composés et d'empreintes

QA/QC : validation méthode *standards*

- Fragmentation
- Précision en masse

QA/QC sur étalons internes *échantillons*

- Stabilité des masses
- Stabilité des temps de rétention
- Aptitude du workflow à les identifier (taux de faux-négatifs)

Identification des composés *échantillons*

- Assignment des formules brutes
- Regroupement des signaux redondants d'un même composé
- Elimination des signaux provenant du « blanc »

Priorisation des composés *inter-échantillons*

- Priorisation des composés (rareté/redondance, abondances relatives)
- Traitements statistiques

Approche non ciblée

□ Analyse non ciblée pour caractériser les profils d'exposition

- ✓ 10 sites choisis du littoral français (différentes pressions)
- ✓ Purification et fractionnement des échantillons selon leur polarité
- ✓ QA/QC: étalons internes et externes marqués

Acquisition des signaux

Identification de composés et d'empreintes

Plusieurs semaines / mois !!

QA/QC : validation méthode

standards

- Fragmentation
- Précision en masse

étalons

internes échantillons

- Stabilité des masses
- Stabilité des temps de rétention
- Aptitude du workflow à les identifier (taux de faux-négatifs)

étalons

des composés échantillons

- Assignment des formules brutes
- Regroupement des signaux redondants d'un même composé
- Elimination des signaux provenant du « blanc »

Priorisation des composés

inter-échantillons

- Priorisation des composés (rareté/redondance, abondances relatives)
- Traitements statistiques

Approche non ciblée

Quelques résultats

- ✓ Par GC-APCI-HRMS-TOF, 5833 clusters halogénés, dont 1311 présents dans au moins 2 échantillons
- ✓ 193 composés identifiés (formule brute) et structure confirmée ou supposée pour 141

**Anthropiques
CB-153**

Me-Triclosan

**Polychloro-
terphényls**

**Naturels
Q1
MHC-1**

- ✓ Identification des hot spots
- ✓ Corrélation des signaux inconnus aux profils de composés de référence

- ❑ Niveaux et distribution géographique sur les côtes françaises
 - Niveaux globalement plus élevés dans l'estuaire de la Seine et en Méditerranée (zones urbaines et industrialisées)
 - PBDE, HBCDD, PFOS, MX, MK, AHTN concentrations $\ll 1$ ng/g ph
 - Niveaux plus élevés pour l'HHCB (estuaire Seine : 14 ng/g ph) et OPE
 - Occurrence globale $> 80\%$

- ❑ Profils de contamination
 - Contaminants prédominants dans la majorité des échantillons (ex: BDE-47, α -HBCDD, HHCB)
 - Différences régionales : exemple en Méditerranée (PFCA $\gg$)
 - Différences inter-spécifiques (Mytilus vs Crassostrea)

- ❑ Tendances temporelles: concordent avec l'usage et les réglementations
 - Diminution des PBDEs depuis milieu-1990's
 - Augmentation exponentielle de α -HBCDD suivi d'une stabilisation/décroissance
 - Diminution du PFOS à partir de 1990; augmentation des PFCA depuis 2004 ; stabilisation actuelle
 - Diminution significative MX (autres muscs stables)

- ❑ Vers une détection plus large qui reste à affiner
 - Précurseurs de PFCA
 - Analyse non ciblée

□ Extension de la liste des CEC

- ✓ Autres RF (validation méthode biote marin et 1ères campagnes d'analyse)

Retardateurs de flamme halogénés alternatifs

Dechloranes (POP candidat)

Composés de remplacements du Penta-BDE

*Composés de remplacement
Recommandations groupe OSPAR
Tendances décroissantes sur PBDE*

- ✓ PFAS alternatifs et précurseurs individuels

*1ers résultats sur précurseurs
en global incitent à chercher
en individuels, pour
identification des sources*

- ✓ Différences de profils moules vs huitres

Prélèvements aux mêmes sites

- ✓ Résultats NTS: nouvelles molécules cibles à identifier

*Poursuite identifications +
acquisitions*

❑ Rapports annuels

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/2019-08/Rapport_2018_Vfin%20%284%29.pdf

❑ Publications scientifiques

✓ Etudes de référence (Chemosphere)

- **Munsch et al., 2013**

Levels and trends of the emerging contaminants **HBCDs (hexabromocyclododecanes) and PFCs (perfluorinated compounds)** in marine shellfish along French coasts

- **Munsch et al., 2015**

Occurrence of legacy and emerging **halogenated organic contaminants** in marine shellfish along French coasts

- **Munsch et al., 2019**

Perfluoroalkyl substances (PFASs) in the marine environment: Spatial distribution and temporal profile shifts in shellfish from French coasts

- **Aminot et al., 2021**

Levels and trends of **synthetic musks** in marine bivalves from French coastal areas

❑ Communications dans les conférences internationales

- **Aminot et al., 2019**

High levels of **unknown perfluorocarboxylic acid precursors** in shellfish from French coasts

39th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, DIOXIN 2019, 25-30 août 2019, Kyoto, Japon

Remerciements

- ❑ Coordination ROCCH : banque d'échantillons / bancarisation
- ❑ Les Laboratoires Côtiers : expertises locales et prélèvements
- ❑ Chercheurs et techniciens du LBCO

- ❑ Soutien financier